

| Entität/Zeitpunkt | Stadium | Studientitel | LKP | Studienverantwortliche |
|------------------------------------|---|--|--|---|
| Mamma - Ca, neoadjuvant | Triple- negativ od. Luminal B/HER2 normal (Zentraltestung vor Rando) Unilaterales od. bilaterales MaCa cT2 od. cT3 od. cT1c + cN+ od. cT1c + pN(SLN) | Genevieve (Phase II) | Prof. Dr. G. von Minckwitz GBG | Prof. Dr. Reimer Prof. Dr. Gerber |
| | HER2 neg./HR pos. | ADAPT (bestehend aus 4 Sub- Protokollen) | Prof. Dr. N.Harbeck München WSG | Prof. Dr. Reimer Prof. Dr. Gerber Dr. Juliane Terpe Dr. Katharina Rosenthal Christine Fischer |
| | HER2 pos./HR pos | ADAPT | Prof. Dr. N.Harbeck München WSG | |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Mamma - Ca, neoadjuvant | HER2- pos. <u>2 Kohorten:</u> PIK3CA Wildtyp PIK3CA mutiert | NeoPHOEBE (Phase II) | Prof. Dr. Loibl GBG | Prof. Dr. Reimer Prof. Dr. Gerber |
| Mamma-Ca adjuvant (erweitert) | HER2- pos. nach neo- adjuv. Therapie (mind. 6 Zyklen + mind. 9Wo Herceptin) mit patholog. Resttumor T1-4, N0-3, M0 | Katherine (Phase III) | Prof. A. Schneeweiss ROCHE | Prof. Dr. Reimer Christine Fischer Dr. Juliane Terpe Dr. Ulrike Hartkopf |
| Mamma-Ca adjuvant (erweitert) | HER2- neg. HR- pos. mit hohem Rezidivrisiko nach neoadj. CHT (mind.16 WO davon mind.6 WO taxanhaltig) | Penelope B (Phase III) | Prof. Dr. Reimer (LKP) GBG | Prof. Dr. Reimer (LKP) Prof. Dr. Gerber Christine Fischer Dr. Katharina Rosenthal |
| Mammakarzinom beim Mann | männliche Patienten Studienteilnahme in neoadj., adjuvanter und metastasierter Situation | MALE (GBG) | Prof. Dr. Loibl GBG | Prof. Dr. B. Gerber Prof. Dr. Reimer |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| Mamma – Ca metastasiert | HER2- pos. nach Herceptin oder Lapatinib als (neo)- adj. Behandlung und/ oder Herceptin in 1st und/oder 2nd-line max. 3 CHT-Regime für Metastasierung | EVITA | Dr. Costa Uni Magdeburg GBG | Prof. Dr. B. Gerber Prof. Dr. Reimer |
| | HER2- neg. / ER- pos. Postmenopausal Ohne vorherige CHT für Metastasierung | TRIO- 22 / Paloma (Phase III) | Pfizer | Prof. Dr. Reimer |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|
| <p>Mamma – Ca metastasiert</p> | <p>HER2 neg. (mit HER2 pos. Tumorzellen = Zentraltestung) bis 3 vorherige palliative CHT- Linien erlaubt</p> | <p>DETECT III (Phase III)</p> | <p>Prof. Dr. W. Janni (UKD) Alcedis, HHUD</p> | <p>Prof. Dr. Gerber</p> |
| <p>Ovariakarzinom Rezidiv</p> | <p>Platin- sensibel</p> | <p>Desktop III- AGO</p> | <p>PD Dr. Harter AGO</p> | <p>Prof. Dr. B. Gerber Prof. Dr. Reimer</p> |
| | <p>Platin- sensibel mit p53- Mutation (Ov-Ca, Tuben- Ca, Peritoneal-Ca mit PD nach >6 Mon. Nach letzter Platin- basierter CHT)</p> | <p>MK-1775 Protocol 004-01 (MSD Studie)</p> | <p>Prof. Dr. Mustea Greifswald</p> | <p>Prof. Dr. Reimer Christine Fischer</p> |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| Ovarialkarzinom Rezidiv | Platin- resistent mit niedriger HER3 mRNA Expression (Ov-Ca, Tuben- Ca, Peritoneal-Ca mit PD <6 Mon. nach letzter Platin- basierter CHT od. während Platin- basierter CHT) | MO 28113- PENELOPE (AGO OVAR 2.20) | Dr. Christian Kurzeder Roche / AGO | Prof. Dr. B. Gerber Prof. Dr. T. Reimer Dr. Ch. Fischer Dr. J. Terpe U. Hartkopf |
| | Platin- sensibel (Ov-Ca, Tuben- Ca, Peritoneal-Ca mit PD nach >6 Mon. Nach letzter Platin- basierter CHT) | AGO- OVAR 2.21 | Prof. Dr. J. Pfisterer AGO | Prof. Dr. B. Gerber Prof. Dr. Reimer Christine Fischer Dr. Juliane Terpe Dr. Henrike Rohrmann |